

農作物栽培管理データ

団体名 (代表名)	農事組合法人 ながさき南部生産組合	生産者名 及び戸数	辰田博伸 他 7 戸	住所	〒859-2305 長崎県南島原市北有馬町戊2465-1	TEL FAX	0957-84-3393 0957-84-3177
--------------	----------------------	--------------	---------------	----	---------------------------------	------------	------------------------------

栽培品目	いちご	品種名	幸の香、かおり野、こいみのり	出荷期間(時期)	11月下旬～5月中旬
------	-----	-----	----------------	----------	------------

栽培面積	260 a	生産量(前年度実績)	372086pk	出荷規格	S・M～3L (160g 180g、200g 230g、240g 400g)
反当株数	7,500 株	生産量(今年度作予測)	380000pk	荷 姿	1pk用DB 4pk用DB コンテナ

年間栽培計画

月次 作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					収穫終了	休耕又は輪作		土壌分析 施肥	花芽分析 定植準備 定植	マルチング	ビニール張り 玉出し	収穫開始
				→								→
防除 使用薬剤名 使用基準 使用目的	「ながさき南部生産組合 : いちごの防除計画」を参照してください											

土作り、施肥について	栽培の特徴	商品特徴・PR
堆肥、有機質肥料を主体に施用し、化学肥料は補完的に使用する。 アニリッチ 6・8・3 : 300～400kg/10a 多木有機液肥3号 グリーンメルティール(葉面散布、マグネシウム16%) ・土壌改良材 カキライム : 200kg/10a 苦土石灰 : 100kg/10a アグリハーモニー2号 : 60kg/10a	天敵等を活用し、化学合成農薬の使用を最低限に抑えた栽培に取り組んでいます。	食べて頂く皆さんのことを考えて栽培した、安心して食べてもらえるイチゴです。 ・幸の香:果皮が濃い紅色で、糖度が安定して高く食味がよい。 ・かおり野:甘酸っぱい強いかがりが特徴。 ・こいみのり:棚持ちが良く、明るい赤色。

※ 参考:長崎県の慣行基準の化学肥料窒素は25kgです。

ながさき南部生産組合：いちごの防除計画

使用時期	対象病害虫	登録番号	農薬名	成分名	使用時期	回数	希釈倍率	毒性	魚毒性
	うどん粉病 灰色かび病	23473	インプレッションクリア	パチルスアミロリクエファシエンス	発病前から発病初期まで	-	1000～2000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	-	
	うどんこ病	21987	ストロビーフロアブル	クレソキシムメチル	収穫前日まで	3	3000～5000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
2カ月前です 注意!!	灰色かび病、うどんこ病 炭そ病	23104	ファンベル顆粒水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩 ピリベンカルブ	収穫前日まで	3	1000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
発生時	うどんこ病	21284	スコア顆粒水和剤	ジフェノコナゾール	収穫前日まで	3	2000倍 (200～400 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	うどん粉病 灰色かび病	19100	フルピカフロアブル	メバニピリム	収穫前日まで	3	2000～3000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	うどんこ病	23368	プロパティフロアブル	ビリオフェノン	収穫前日まで	3	3000～4000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	炭そ病	21816	デランフロアブル	ジチアノン	育苗期	2	1000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	黒腐病、炭そ病	19426	セイビアーフロアブル20	フルジオキシニル	収穫前日まで	3	1000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	灰色かび病						1000～1500倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)		
	うどんこ病、黒色根腐病 灰色かび病、輪斑病	22209	アフエットフロアブル	ベンチオピラド	収穫前日まで	3	2000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	うどん粉、灰色かび病	24071	パレード20フロアブル	ピラジフルミド	収穫前日まで	3	2000～4000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	コナジラミ クロバネキノコバエ アザミウマ ハスモンヨトウ	22910	ディアナSC	スピネトラム水和剤	収穫前日まで	2	2500倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	アザミウマ、オオタバコガ ハスモンヨトウ						2500～5000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)		
	アザミウマ、オオタバコガ ハスモンヨトウ	21333	ブレオフロアブル	ビリダリル	収穫前日まで	4	1000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	オオタバコガ ハスモンヨトウ	21916	フェニックス顆粒水和剤	フルベンジアミド	収穫前日まで	2	2000～4000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	ハスモンヨトウ	22464	ブレバソンフロアブル5	クロラントラニリプロール	収穫前日まで	2	2000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	ハダニ類	20448	マイトコーネフロアブル	ビフェナゼート	収穫前日まで	2	1000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	ハダニ類 シクラメンホコリダニ	22305	スターマイトフロアブル	シエノピラフェン	収穫前日まで	2	2000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	ハダニ類 シクラメンホコリダニ	19656	コロマイト水和剤	ミルベメクチン	収穫前日まで	2	2000倍 (150～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	ハダニ類	22034	ダニサラバフロアブル	シフルメトフェン	収穫前日まで	2	1000倍 (100～350 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	アザミウマ類 アブラムシ類	19326	モスピランジェット	アセタミプリド	収穫前日まで	2	50 g / 400㎡	劇物	
	アブラムシ類 コナジラミ類	22797	コルト顆粒水和剤	ビリフルキナゾン	収穫前日まで	3	3000～4000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
	アブラムシ類 コナジラミ類	21812	ウララDF	フロニカミド	収穫前日まで	2	2000～4000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)	普通物	
							2000倍 (100～300 $\frac{1}{2}$ g/10a)		

ながさき南部生産組合：いちごの防除計画

使用時期	対象病害虫	登録番号	農薬名	成分名	使用時期	回数	希釈倍率	毒性	魚毒性
	アザミウマ類	20178	スピノエース顆粒水和剤	スピノザド	収穫前日まで	2	5000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	アブラムシ類・ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	18953	アーデント水和剤	アクリナトリン	収穫前日まで	4	1000倍 (150～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	23187	モベントフロアブル	スピロテトラマト水和剤	収穫前日まで	3	2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	果柄伸長	24260	住友ジベレリン液剤	ジベレリン	頂花の出蕾直後～開花直前	1	10ppm (1株当り 5ml)	普通物	
	ハダニ類	22531	チリカワーカー	チリカブリダニ	発生時	-	100～300ml/10a (約2000～6000頭)	-	
	ハスモンヨトウ	23554	クミアイベネビアOD	シアントラニリプロール	収穫前日まで	3	2000～4000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チバクロバネキノコバエ カキノヒメヨコバエ						2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)		
	ハダニ類	19962	パロックフロアブル	エトキサゾール	収穫前日まで	1	2000倍 (100～350 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
2カウトです 注意!!	ハダニ類	23629	ダブルフェースフロアブル	ビフルブミド フェンピロキシメート	収穫前日まで	1	2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	ハダニ類	22801	サフオイル乳剤	調合油	収穫前日まで	-	300～500倍 (100～500 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	チャノホコリダニ コナジラミ類、うどんこ病						300倍 (100～500 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)		
	ハダニ類・オオタバコガ ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	19842	アフアーム乳剤	エマメクチン安息香酸塩	収穫前日まで	2	2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	ナメクジ類、カタツムリ類	21929	スラゴ	燐酸第二鉄水和物	発生時	-	1～5 g / m ²	普通物	
	アザミウマ類	24070	ファインセーブフロアブル	フロメトキン	収穫前日まで	3	1000～2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	劇物	
	うどんこ病、アブラムシ類 コナジラミ類、ハダニ類	22477	ムシラップ	ソルピタン脂肪酸エステル	収穫前日まで	-	500倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	アザミウマ類、ハダニ類 オオタバコガ、ハスモンヨトウ	24185	グレーシア乳剤	フルキサメタミド	収穫前日まで	2	2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	ハダニ	24213	ダニオーテフロアブル	アシノナビル	収穫前日まで	2	2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	
	アザミウマ類、 ハスモンヨトウ クロバネキノコバエ類	18500	カスケード乳剤	フルフェノクロン	収穫前日まで	3	4000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	普通物	

類	主な対象病害虫	登録番号	資材名	有効成分 (%)	登録会社
BT剤	コナガ・ヨトウ 他	23943	チューンアップ顆粒水和剤	BT菌生芽胞及び結晶毒素 10% 3000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	アグロ カネショウ
		14459	トアロー水和剤 CT	BT菌結晶毒素 7% 2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	東亜合成
		20056	トアローフロアブル CT	BT菌結晶毒素 7% 2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	東亜合成
		15000	バシレックス水和剤	BT菌生芽胞及び結晶毒素 10% 2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	エス・ディー・エス バイオテック
		19616	ゼンターリ顆粒水和剤	BT菌生芽胞及び結晶毒素 10% 2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	住友化学
		19885	エスマルク DF	BT菌生芽胞及び結晶毒素 10% 2000倍 (100～300 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	住友化学

※ 散布・使用時の量・濃度は、規定（注意書き・レベル）の少ない量・薄い濃度で使用する。

※ ダニ天敵（チリカブリダニ）放飼の補完的活用。アブラムシ天敵（アブラバチ）放飼の補完的活用。

※ 殺虫剤・殺菌剤は育苗・本圃合せて、成分カウント 1 5 回の使用に抑えるよう努力する。

有機で使用可能なものはカウントしない。

※ 参考：長崎県の慣行基準の農薬使用回数は 6 5 回です。